



ผลการศึกษาวิจัย
ผลของความสำเร็จในการให้อาหารเลี้ยงรางค่อประสิทธิภาพ
ของลูกสุกรก่อนหย่านม

โดย

นายธีรพล

เย็นตระอ๑๔

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2

นายอานนท์

ช่ออารีย์

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2

นางสาวชวดี

สารวิกัน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ผลของความถี่การให้อาหารเลี้ยงรางค่อประสิทธิภาพของลูกสุกก่อนหย่านม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของการให้อาหารลูกสุก โดยมีการจัดลูกสุกรแรกคลอดที่มีน้ำหนัก 1.3 - 1.5 ไร่โนคอกเดียวกันคอกละ 12 ตัว ติดป้ายไว้หน้าคอกและหลังคอกสุกรเพื่อจำได้ง่าย เมื่อลูกสุกรอายุได้ 4 วัน เริ่มให้อาหารเลี้ยงรางกับลูกสุกรโดยบันทึกการให้อาหารในแต่ละมื้อลงในแบบกรอกข้อมูล เก็บอาหารตอนเช้า ก่อนให้อาหารรอบแรกของทุกวันใส่ถุงใช้ปากกาเคมีเขียนไว้ข้างถุงวันที่เก็บ แยกเป็นคอก แยกเป็นกลุ่มการทดลอง ผลของการทดลอง พบว่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 การกินอาหารของลูกสุกรน้อยกว่ากลุ่มอื่น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ซึ่งบ่งบอกว่าวิธีการให้อาหารของกลุ่มที่ 1 ที่มีความถี่วันละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมไม่สามารถทำให้ลูกสุกรกินอาหารได้ ทัดเทียมกับกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ที่มีความถี่ 8 และ 12 ครั้งต่อวัน หากต้องการฝึกการกินอาหารของลูกสุกรต้องพิจารณาปรับแก้ไข ความถี่ในการให้อาหารเป็น 8 ครั้งต่อวันขึ้นไปตามลำดับ และส่วนค่านปริมาณที่กินได้ของแม่สุกรแต่ละหน่วยทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีการให้อาหารที่เท่ากัน พบว่า น้ำนมที่ให้ลูกสุกรแต่ละหน่วยมีปริมาณเท่ากัน