



การเปรียบเทียบปุ๋ย 2 สูตร ระหว่างน้ำหมักจากนมเปรี้ยว
และปุ๋ยมูลไก่ ต่อการเจริญเติบโตหอมแบ่ง

โดย

นางสุมาลี เพ็งบ้านไร่
นางสาวสุภาวดี วิเชียรศาสตร์
นางสาวพิสมัย เท็ชรัตน์
ระดับชั้น ปวช. 3 เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ(Abstracts)

จากการศึกษาการเปรียบเทียบปุยสองสูตรต่อการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง ซึ่งใช้สูตรปุยที่แตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) ประกอบด้วย 2 treatment 3 Replications ดังนี้

Treatment ที่ 1 ใส่น้ำหมักจากนมเปรี้ยว

Treatment ที่ 2 ใส่อยูนิโคไลน

ผลการศึกษาพบว่า หอมแบ่งที่ใส่อยูนิโคไลน มีความสูงของลำต้นมากที่สุด เฉลี่ย 31.34 เซนติเมตร รองลงมา คือ หอมแบ่งที่ใส่น้ำหมักยีสจากนมเปรี้ยว มีความสูง เฉลี่ย 28.49 เซนติเมตร